

第三次全国结核病流行病学抽样调查

1990 年 1 月 31 日卫生部防疫司下发卫防慢字(90)第 3 号文件“关于开展 1990 年全国第三次结核病流行病学抽样调查的通知”，决定在 1990 年进行全国第三次结核病流行病学抽样调查。同时下发了“1990 年全国结核病流行病学抽样调查计划和实施方案”、“1990 年全国结核病流行病学抽样调查实施细则”、“1990 年全国结核病流行病学抽样调查细菌学检查工作细则”、“全国流调组织及人员名单”。

全国第三次结核病流行病学抽样由卫生部卫生防疫司直接领导，由北京全国结核病防治研究中心、上海全国结核病防治研究分中心及有关省、市专业人员组成技术顾问组、技术指导组、办公室，流调办公室设在北京全国结核病防治研究中心。技术顾问组组长严碧涯，副组长汪士、王德理。成员王忠仁、李晖、汪钟贤、那希宽、张库、吴霁棠、郝敏、钱元福、黄汀涛、解学智、阚冠卿。技术指导组组长李拯民，副组长郭生贵、谈彬庸、端木宏谨。成员刘传金、宋文虎、肖成志、许荣华、杨紫缜、赵丰曾、郭文玉、施鸿生、张缙、张立兴、张发达、张福生、谢汇江、潘毓萱。办公室主任赵丰曾、副主任施鸿生、郭文玉、高同军。全国 29 个省、市、自治区共组织 541 个调查队，5538 名流调队员。调查点由全国流调办公室统一抽样确定。全国共调查 928 个点，调查点受检总人数为 1461190 人。

1990 年 4 月山东省流调点现场调查最先起始，同年 12 月西藏自治区最后一个点结束现场调查，现场调查历时 9 个月。1990 年 9-12 月，全国分为东北、华北、华东、华南、西北、西南六个大区分别进

行了验收。

流调结果:

1990 年全国肺结核患病率为 523/10 万，涂阳患病率为 134/10 万。患病率年均递减幅度:1979-1990 年，肺结核患病率年均递降率为 28%，涂阳患病率年均递降率为 3.0%。全国结核病死亡率为 21/10 万，肺结核死亡率为 19/10 万，结核病死亡在各种死亡原因中居第七位。估算患者数:全国活动性肺结核患者数 593.2 万，涂阳肺结核患者数 151.4 万，每年死于结核患者数约 23.8 万。

1992 年 3 月，《1990 年全国结核病流行病学抽样调查资料汇编》由卫生部编著出版。